

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

- **OPVK 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách**
- **Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT**
- **Sada č. 1 – Ptactvo - Český jazyk, 2. ročník**
- **VY\_32\_INOVACE\_01\_ČJ**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VY\_32\_INOVACE\_01\_ČJ

## Čáp bílý

**Čáp bílý** je snad nejznámější český brodivý pták z čeledi čápovití, příbuzný volavkám a ibisům. Vyskytuje se v Evropě, střední Asii a severozápadní Africe.

### Popis

Na české poměry poměrně velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 – 4,4 kg, průměr je kolem 3,5 kg, samice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel je 155–165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé. Na rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem je klapání zobákem.

### Způsob života

Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často se však nacházejí v blízkosti lidských obydlí. Na konci léta čápi odlétají na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo jedinců přezimuje i ve střední Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kusů ročně. Tažná hejna mohou čítat i stovky ptáků.

### Potrava

Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi, hmyz a jeho larvy, hraboši (významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců. V Africe často sleduje hejna sarančat.

### Rozmnožování

Hnízda si staví na stromech, střechách, komínech. Hnízdění probíhá buď jednotlivě, nebo v menších skupinách a začíná v období duben – květen. Hnízdo se skládá převážně z větví a klacků, samice snáší v průměru 2–4 vejce, výjimečně jen 1 nebo dokonce 5. Inkubace vajec trvá přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.

### Ohrožení

Podle údajů z 19. století byl čáp bílý na tahu běžně ve velkém odstřelován obyvatelstvem, ať již pro zábavu, či pro maso. Až do poloviny 20. století hnízdil čáp bílý v Česku pouze na Třeboňsku, Písecku a na jižní Moravě. Mezi největší hrozby pro tento druh nepochybně patří odvodňování mokřin, elektrická vedení, používání pesticidů při ničení sarančí a nezákonný odstřel jednotlivých jedinců v Africe.

**Čáp patří v ČR mezi ohrožené druhy.**



## Kontrolní otázky k textu:

1. Čáp je nejznámější.....pták,  
z čeledi .....
2. Váha čápa je kolem....., výška je.....
3. Čapí potravou jsou.....  
.....
4. Samice snáší (uved' přibližný počet) .....vajec.
5. Rodiče zahřívají svá vejce přibližně.....dnů.
6. Na konci léta čapí odlétají do.....  
.....
7. V ČR patří čáp mezi.....

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

**Použité zdroje:**

[http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p\\_b%C3%AD%C3%BD](http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_b%C3%AD%C3%BD)

- Čáp



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ